

BIJSLUITER**Vetranquil 25 mg tabletten voor honden en katten.****1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Ceva Santé Animale B.V.
Tiendweg 8c
2671 SB Naaldwijk
Nederland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Vetranquil 25 mg tabletten voor honden en katten.

3. GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDDD(E)L(EN)

Per tablet:

Werkzaam bestanddeel:

34 mg acepromazinemaleaat, overeenkomend met acepromazine 25 mg.

4. INDICATIE(S)

Alle situaties waarbij sedering gewenst is, bijvoorbeeld tijdens transport of verhokken, agressie en preventie van stress.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij:

- hypotensie;
- hypothermie;
- anemie;
- epilepsie.

6. BIJWERKINGEN

- hypotensie;
- tachycardie;
- bij katten: tremoren, beven, lethargie, spierslapte, verdwijnen van de oprichtreflexen

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond en kat.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Hond: 1,25 - 2mg acepromazine per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags;
Kat: 0,5 – 2 mg acepromazine per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Voor orale toediening

10. WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Niet toedienen aan honden en katten lichter dan 3 kg.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht of lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet toedienen samen met choline-esteraseremmers zoals organische fosfor-verbindingen (insecticiden) en procaïne HCl, waarvan de toxiciteit versterkt wordt.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek 6.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

13 september 2016

15. OVERIGE INFORMATIE

PVC-Blister à 10 tabletten, verpakt in een kartonnen doos per 40 tabletten.

REG NL 1948

KANALISATIE

UDA